

**ESPAÑOL**

# Comprensión de ELIGARD®

El tratamiento para el cáncer de próstata  
avanzado con la tecnología única de  
liberación prolongada



**Eligard®**

(leuprolide acetate) for injectable suspension

**Consulte la parte interior para ver información  
de seguridad importante**

# Terapia hormonal, LHRH y ELIGARD® (acetato de leuprolida) para suspensión inyectable

Las células cancerosas de la próstata necesitan hormonas llamadas andrógenos para replicarse. En los hombres, el andrógeno principal es la testosterona. El objetivo de la terapia hormonal es evitar que el cuerpo produzca testosterona, **lo que puede ralentizar el crecimiento del tumor o incluso reducir su tamaño, al menos durante cierto tiempo.**<sup>1</sup>

Hay varios tipos diferentes de terapias hormonales, y se agrupan en función de cómo trabajan para controlar la testosterona. **Los agonistas de la hormona liberadora de la hormona luteinizante** (LHRH) son medicamentos que detienen la producción de testosterona en los testículos.<sup>1</sup>


## Información de seguridad importante

ELIGARD® se utiliza para el tratamiento del cáncer de próstata avanzado. ELIGARD es un medicamento con receta cuya administración debe estar a cargo de un profesional de la salud.

- ELIGARD no debe ser usado por ninguna persona que sea alérgica a alguno de los componentes de ELIGARD o a algún medicamento similar.

Consulte más información de seguridad importante en las siguientes páginas y la información farmacológica completa que se adjunta o visite [Eligard.com](http://Eligard.com)

## Cómo se produce la testosterona



**Los agonistas de la LHRH, como ELIGARD®**, actúan como la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) propia del cuerpo y al principio estimulan la producción de la hormona luteinizante. Sin embargo, la presencia continua de niveles altos de LHRH en realidad hace que la hipófisis deje de producir la hormona luteinizante y, como resultado, no se estimula a los testículos para producir testosterona.<sup>1</sup>

 **Eligard®**  
(leuprolide acetate) for injectable suspension



### Información de seguridad importante (continuación)

- ELIGARD provoca un aumento en la testosterona durante las primeras semanas de tratamiento y algunos hombres pueden experimentar la aparición de nuevos síntomas o un empeoramiento de los síntomas del cáncer de próstata, por ejemplo, dolor en los huesos, síntomas urinarios o problemas relacionados con los nervios, como entumecimiento, durante este período. Si el cáncer se ha diseminado hacia el tracto urinario o la columna, se puede experimentar obstrucción de la salida de la vejiga o presión en la columna, lo que puede provocar una parálisis. Su médico analizará junto con usted los beneficios y los riesgos de utilizar ELIGARD.
- También se ha informado un mayor riesgo de desarrollar infarto de miocardio, muerte súbita cardíaca y accidente cerebrovascular en hombres que utilizan ELIGARD. ELIGARD también puede afectar la actividad eléctrica del corazón, lo que puede provocar que el pulso sea irregular. Su médico lo controlará para detectar posibles afecciones cardíacas.

Consulte más información de seguridad importante en las siguientes páginas y la información farmacológica completa que se adjunta o visite [Eligard.com](http://Eligard.com)

## Por qué el médico le receta ELIGARD®

ELIGARD es un agonista de la LHRH comprobado con una fórmula única que permite la liberación constante de medicamento. Puede elegir entre varias opciones de dosificación, incluida la opción de recibir 1 inyección cada 6 meses (es decir, solo 2 veces al año).<sup>2,3</sup>

Si usted vive con cáncer de próstata avanzado desde hace un tiempo, es posible que su médico ya le haya hablado sobre las opciones de tratamiento con LHRH. Los tratamientos con agonistas de la LHRH se administran mediante inyecciones, pero los diferentes tratamientos ofrecen distintas fórmulas y esquemas de dosificación.

 **Eligard**®

(leuprolide acetate) for injectable suspension



### **Información de seguridad importante (continuación)**

- Se han informado casos de hiperglucemia y un mayor riesgo de desarrollar diabetes en hombres que reciben ELIGARD. Su médico se encargará de controlar los niveles de glucemia.
- Se han observado convulsiones en pacientes que usan acetato de leuprolida, incluidos los pacientes que tienen antecedentes de convulsiones, epilepsia o trastornos cerebrales (relacionados con los vasos sanguíneos, los nervios o tumores), y en aquellos que toman medicamentos relacionados con las convulsiones. También se han informado convulsiones en pacientes que no padecen ninguna de estas afecciones.
- ELIGARD puede causar daño fetal si se administra a una mujer embarazada. Los cambios hormonales esperados que ocurren con el tratamiento de ELIGARD aumentan el riesgo de pérdida de embarazo.
- ELIGARD puede afectar la fertilidad de los hombres con capacidad reproductiva.

**Consulte más información de seguridad importante en las siguientes páginas y la información farmacológica completa que se adjunta o visite [Eligard.com](http://Eligard.com)**

## **ELIGARD® tiene una fórmula única que permite la liberación constante de medicamento**

Hay muchas opciones de tratamiento para el cáncer de próstata avanzado.

Su médico ha recomendado ELIGARD, el tratamiento con LHRH que utiliza la tecnología única de liberación prolongada de gel polimérico para permitir una liberación controlada del medicamento.

Se comprobó que ELIGARD disminuye la testosterona por debajo de los niveles de castración y que mantiene esos niveles bajos a lo largo del tiempo.<sup>3</sup> Para entender más, es importante saber cómo se administra ELIGARD y cómo permanece en el organismo.

 **Eligard®**

(leuprolide acetate) for injectable suspension

## Liberación constante de medicamento con la innovadora tecnología de liberación prolongada de gel polimérico

Al igual que todos los agonistas de la LHRH, ELIGARD® se administra mediante una inyección. Pero a diferencia de otros, tiene una innovadora tecnología de liberación de gel polimérico diseñada para liberar una dosis continua de medicamento en el cuerpo hasta la próxima inyección de ELIGARD, independientemente de la dosis que elija.<sup>2</sup>

La liberación constante y sostenida del medicamento permite que usted y su médico elijan entre varios esquemas de dosificación diferentes, según el que sea adecuado para usted.<sup>2,3</sup>



**ELIGARD se ofrece en dosis todos los meses, cada 3 meses, cada 4 meses o cada 6 meses, lo que permite la administración de apenas 2 inyecciones por año**

**Consulte a su médico si ELIGARD es adecuado para usted.**

### Información de seguridad importante (continuación)

Las reacciones más comunes que se pueden producir en la zona de la inyección son ardor y picazón transitorios, dolor, aparición de hematoma y enrojecimiento. Los efectos secundarios más comunes incluyen sofocos y sudoración, fatiga, debilidad, dolor muscular, mareos, piel húmeda y pegajosa, atrofia testicular, disminución de las erecciones y agrandamiento de los pechos.


**Consulte más información de seguridad importante en las siguientes páginas y la información farmacológica completa que se adjunta o visite [Eligard.com](http://Eligard.com)**

## Cómo funciona el sistema de liberación prolongada de ELIGARD®<sup>2</sup>


ELIGARD se inyecta en la capa de grasa o "subcutánea" de la piel. Esto significa que no se inyecta en el músculo. ELIGARD puede inyectarse en una de varias zonas de inyección elegidas, como el abdomen, el brazo o la parte superior de las nalgas.




ELIGARD se inyecta como un líquido en la capa subcutánea de la piel.



El líquido se solidifica y se transforma en una perla del tamaño de un guisante. Es posible que sienta un bulto diminuto inmediatamente después de la inyección, que desaparece con el tiempo.



La perla de ELIGARD se disuelve lentamente, y libera el medicamento de forma constante en el período de dosificación.



 **Eligard®**

(leuprolide acetate) for injectable suspension

# Efectos secundarios comunes de las terapias hormonales y consejos para controlarlos

Muchos hombres experimentan efectos secundarios durante las terapias hormonales como resultado de los bajos niveles de testosterona. Es importante entender estos efectos secundarios y las maneras de controlar aquellos que son más comunes. Esta información no reemplaza el asesoramiento del médico; asegúrese de hablar con su médico acerca de cualquier efecto secundario que tenga o los cambios en el estilo de vida que realice durante el tratamiento.

## Sofocos

Podría experimentar una sensación repentina de calor en la cara, el cuello, el pecho y la espalda. Puede durar de unos pocos segundos a una hora.



**Consejo:** Hable con su médico si tiene sofocos. Podría ayudarlo.

## Fatiga (cansancio)

Es posible que sienta cansancio extremo, agotamiento o que incluso tenga dificultades para concentrarse. La fatiga tiene muchas causas, entre ellas, inactividad, sueño deficiente y efectos secundarios de los medicamentos.



**Consejo:** Puede hacer varias cosas fáciles para sobrellevar la fatiga:

- Hable con su médico para determinar la causa
- Descanse lo suficiente
- No se exija
- Haga caminatas cortas y ejercicio, si es posible
- Coma alimentos que aporten energía
- Realice actividades que alivien el estrés

## Molestias por la inyección

Es posible que sienta algunas molestias durante y después de las inyecciones de ELIGARD, lo cual es temporal. Los siguientes son algunos efectos secundarios comunes relacionados con la inyección<sup>3</sup>:

- Ardor y picazón
- Dolor
- Hematomas
- Enrojecimiento

**Podría haber otros efectos secundarios y siempre debe decirle a su médico cómo se siente cuando recibe la terapia hormonal.** Se han informado efectos secundarios adicionales con el uso de ELIGARD. Consulte más información de seguridad importante sobre ELIGARD.

## Información de seguridad importante (continuación)

Se han informado otros efectos secundarios con el uso de ELIGARD, lo que incluye el adelgazamiento de los huesos (que puede provocar fracturas) y problemas poco frecuentes pero graves con la hipófisis en el cerebro.

**Consulte más información de seguridad importante en las siguientes páginas y la información farmacológica completa que se adjunta o visite [Eligard.com](http://Eligard.com)**

 **Eligard**<sup>®</sup>

(leuprolide acetate) for injectable suspension

# ELIGARD® y recursos de apoyo para el cáncer de próstata

Encuentre el apoyo que usted y su familia necesitan mientras afronta el cáncer de próstata avanzado, desde ayuda financiera hasta apoyo para cuidadores.

## Asistencia financiera

**TOLMAR Total Solutions®**  
1-844-TOLMAR1 (865-6271)

*Las personas que reúnan los requisitos pueden obtener ayuda con el costo de ELIGARD a través del programa de asistencia para pacientes (PAP). El personal del consultorio de su médico también puede llamar para hacer preguntas sobre la asistencia para pacientes y el seguro médico.*

**BenefitsCheckUp®** [benefitscheckup.org](http://benefitscheckup.org)

**CFAC: Cancer Financial Assistance Coalition**  
[cancerfac.org](http://cancerfac.org)

**CancerCare® Co-Payment Assistance Foundation**  
[cancercarecopay.org](http://cancercarecopay.org)  
1-866-55-COPAY (2-6729) o 1-212-601-9750

**Health Well Foundation®**  
[healthwellfoundation.org](http://healthwellfoundation.org)  
1-800-675-8416

**Herramienta de Asistencia en Medicamentos**  
[medicineassistancetool.org](http://medicineassistancetool.org)

**Patient Advocate Foundation**  
[copays.org](http://copays.org)  
1-866-512-3861

 **Eligard®**  
(leuprolide acetate) for injectable suspension

## Educación

**Men's Health Network™**  
[menshealthnetwork.org](http://menshealthnetwork.org)

**American Cancer Society®**  
[cancer.org/cancer/prostate-cancer](http://cancer.org/cancer/prostate-cancer)  
1-800-227-2345

**Urology Care Foundation**  
[urologyhealth.org](http://urologyhealth.org)  
1-800-828-7866

**Blue Cure®**  
[bluecure.org](http://bluecure.org)

**Prostate Health Education Network, Inc.**  
[prostatehealthed.org](http://prostatehealthed.org)  
1-617-481-4020

## Apoyo

**Prostate Cancer Foundation**  
[pcf.org](http://pcf.org)  
1-800-757-CURE (2873)

**Prostate Cancer Research Institute**  
[pcri.org](http://pcri.org)

**ZERO – The End of Prostate Cancer**  
[zerocancer.org](http://zerocancer.org)  
1-844-244-1309

**CancerCare®**  
[www.cancercares.org](http://www.cancercares.org)  
1-800-813-4673

## Cuidado

**Instituto Nacional del Cáncer**  
[cancer.gov](http://cancer.gov)  
1-800-4-CANCER (422-6237)

**National Comprehensive Cancer Network®**  
[nccn.org/patientresources/patient-resources](http://nccn.org/patientresources/patient-resources)  
1-215-690-0300

# Información de seguridad importante sobre ELIGARD®

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN  
ELIGARD.com

ELIGARD se utiliza para el tratamiento del cáncer de próstata avanzado. ELIGARD es un medicamento con receta cuya administración debe estar a cargo de un profesional de la salud.

- ELIGARD no debe ser usado por ninguna persona que sea alérgica a alguno de los componentes de ELIGARD o a algún medicamento similar.
- ELIGARD provoca un aumento en la testosterona durante las primeras semanas de tratamiento y algunos hombres pueden experimentar la aparición de nuevos síntomas o un empeoramiento de los síntomas del cáncer de próstata, por ejemplo, dolor en los huesos, síntomas urinarios o problemas relacionados con los nervios, como entumecimiento, durante este período. Si el cáncer se ha diseminado hacia el tracto urinario o la columna, se puede experimentar obstrucción de la salida de la vejiga o presión en la columna, lo que puede provocar una parálisis. Su médico analizará junto con usted los beneficios y los riesgos de utilizar ELIGARD.
- También se ha informado un mayor riesgo de desarrollar infarto de miocardio, muerte súbita cardíaca y accidente cerebrovascular en hombres que utilizan ELIGARD. ELIGARD también puede afectar la actividad eléctrica del corazón, lo que puede provocar que el pulso sea irregular. Su médico lo controlará para detectar posibles afecciones cardíacas.
- Se han informado casos de hiperglucemia y un mayor riesgo de desarrollar diabetes en hombres que reciben ELIGARD. Su médico se encargará de controlar los niveles de glucemia.
- Se han observado convulsiones en pacientes que usan acetato de leuprolida, incluidos los pacientes que tienen antecedentes de convulsiones, epilepsia o trastornos cerebrales (relacionados con los vasos sanguíneos, los nervios o tumores), y en aquellos que toman medicamentos relacionados con las convulsiones. También se han informado convulsiones en pacientes que no padecen ninguna de estas afecciones.

- ELIGARD puede causar daño fetal si se administra a una mujer embarazada. Los cambios hormonales esperados que ocurren con el tratamiento de ELIGARD aumentan el riesgo de pérdida de embarazo.
- ELIGARD puede afectar la fertilidad de los hombres con capacidad reproductiva.

Las reacciones más comunes que se pueden producir en la zona de la inyección son ardor y picazón transitorios, dolor, aparición de hematoma y enrojecimiento. Los efectos secundarios más comunes incluyen sofocos y sudoración, fatiga, debilidad, dolor muscular, mareos, piel húmeda y pegajosa, atrofia testicular, disminución de las erecciones y agrandamiento de los pechos.

Se han informado otros efectos secundarios con el uso de ELIGARD, lo que incluye el adelgazamiento de los huesos (que puede provocar fracturas) y problemas poco frecuentes pero graves con la hipófisis en el cerebro.

El médico puede brindarle asesoramiento al respecto. Usted puede informar efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al 1-800-FDA-1088.

**Consulte más información de seguridad importante en las siguientes páginas y la información farmacológica completa que se adjunta o visite [Eligard.com](http://Eligard.com)**

#### Referencias:

1. <https://www.nccn.org/patients/guidelines/prostate/index.html>. Se accedió en enero de 2020. 2. Sartor O. *Eur Urol* 2006 3. ELIGARD® (acetato de leuprolida) para suspensión inyectable [prospecto]. Fort Collins, CO: Tolmar, Inc.; 2024.

 **Eligard®**

(leuprolide acetate) for injectable suspension





**OBTENGA MÁS INFORMACIÓN**  
**ELIGARD.com**



© 2024 Tolmar, Inc. Todos los derechos reservados. Tolmar, ELIGARD, Tolmar Total Solutions y sus logotipos asociados son marcas comerciales del grupo Tolmar. Las marcas comerciales y los nombres de productos de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios. TPI.2020.spa.2185.v1 09/24

 **Eligard**<sup>®</sup>  
(leuprolide acetate) for injectable suspension